Canaïolo nero

Vass6R04s171-175

Collection Vassal-Montpellier

1246Mtp3

Canaïolo néro 5.12 5.14 \oplus







1246 DESIGNATION: Canaïolo nero CLOS 5 PLANCHE 12 RANG S Souche 14 Vigueur :

PORT : érig - 1 érig - couché

Pédoncule : L - M - C Millerandage : O Date de Véraison: 2-8-74 Date de Maturation: 4-9,74 Pourriture : G - M - P : L - M - C

disc. - (ph. - ell) ov. CGULBUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE : s10

s23 s30 avec pépins - apyrène

s42 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Canaiolo nero CLOS 5 PLANCHE 12 RANG Souche 14 Vigueur: 2 PORT : erig - 1/2 érig - couché Millerandage: O Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3-9.75 x+3 Pourriture : 0 _ 13 GRAPPE : G - M - P : L - M - C) BAIE : TG - G - M- P 16×16 disc. - (Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 s2 s3 s4 s5 avec pépins - apyrène JUS : /inc.) - coloré

Canaiolo nero clos 5 Phaughe 12 RANG S Souche 14 Viguour , 15 PORT (éri) - éris - couché Hillerandage : 0 Date de Véraison : 23-7 Date de Maturité : 7.% .76 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (1) - P : 11 - (1) - (0) BATE : TO - G - O- P 47 - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COVILIUM : B1 - Gr - Rs - Rg - 🖯 SAVEUR : 6 - m - ar - for - horb. s20 avoc (pépins) - apyrène - coloré

======= ! ! ! !	Nombre Total d'yeux	DATES							
! ! ! !		31.3	4.4	6.4					
! ! 1 \ !	0 !			!!!!					
2		- 1							
3		•			40 1	9			
4	4	U	1	12 1	066-4-73x +	0			
5	4	1	1	2 1					

!!		! Nombre ! Total	DATES!							
!!		d'yeux	20,3	27.3						
!!!	16		!	! ! ! !						
!	2	2	1	2 , !						
!!	3	2	0	2 .	7/0 %					
!!!	4	2	6	2 1	De 23-3.74x					
!	5	4	O	3 - 1	0 4 1 1 1					

Canaïolo néro Année : 1975 Emplacement 5.12 \$14 / Désignation /.....

=== ! !	=====	! Nombre		D A T E S !							
!!!		! d'ye		10.3	1 43 (3	17.3	21.3	!!!!			
!	1	! 4	11	:2	- i h -	14-	! 4 *	! ! ! !			
!	2	! 2	0	10	0	0	! 0	!!!!			
!	3	! 4	1	11	! 2 -	: 3 -	! 3 *	1.6			
!	4	! 4	0	! 0	0	10	10	1+0			
!	5	4	0	10	!0	11	! 2 %	!!!!			

De19-3.75.

ANDEE: 1996 MGM Canaido Méro EMPLACEMENT 5 12 513

6 R 4 1171-175

12	124603 684 1171-175												
iche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		vé: début	raison mi/v		Maturité	
1	3	4,3	18.3 *	2	4	2915	1.6	3,6	307	318	7.8	20.9	
2 3 4 5	6 2	4,3	18:3 * 18:3 * 11,3 × 18.3 × 18.3 ×		29.5 1.6 3.6 30.7 3.8 7.8 20.9 +2 +2 +5 +2 +5 +5								

Canacolo noro 5. 12 \$14 4-5

Emplacement :

Désignation :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement :

Canaide nero

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 8.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation :
Emplacement :

Canaïolo nero 5.12 \$ 14 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 danse rouge foncé 4 base

52 - bourgeon : coloré O- vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

No ordre

Canaïolo néro

Désignation

5-12514

VASSAL

Planche côté nº

8

souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 ? <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 tentièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 bytentièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Nº d'ordre Désignation 5-12 \$14 souche 1 2 3 côté Νō VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière () irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.) 27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde (2 ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ()- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec plpus 3 3I - A pédicelle long I - moyen 2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

32 - A bourrelet évident (1 peu apparent 2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (Î) - difficile 2.

3I - A bourrelet de couleur verte 7) - rouge 8 - irrégulière 9.

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

-Canaiolo nero 5-12514 A.3

SARNENT DE VIGNE

: long (), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2), moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3); saillants (4). Moeuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4).
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: 1246.03 Désignation: Canaiolo nero
 Origine :
 Emplacement: 5-12 S14
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 3 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ...... (1-(2)-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L'<sub>3</sub> ...... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forme : (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année : 4999

Code cépage: 1246

Code clone: 03

Nom cépage: Canai elo mero

Observateur

Emplacement: 5.12514 6 Rg 4 S. 171-175.

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1)- elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - strie

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 12 présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence (1) présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds**: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 - petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha**: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 **formation de cal de soudure**: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse**: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2}- saillants 3

vigueur 3 puine 2

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Code cépage 1246 Nom cépage lanaillo

Code clone : 03

Observateur

Emplacement: 6 Russiti-175

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie (5) oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 🗗 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles absentes () - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence ()- présence (). oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence De présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds : très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 5 moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9 70 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9 05

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - cle e 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé : très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants (3)